

GUIDE À L'ATTENTION DES PATIENTS POUR LE BON USAGE DE BIMZELX[®] EN AUTO-INJECTION

SERINGUE PRÉREMPLIE
DE 160 MG DE BIMEKIZUMAB



Avant de procéder à une injection, vous devez recevoir une formation sur la façon d'injecter BIMZELX[®]. Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier.ère si vous avez besoin d'aide.

Veillez lire attentivement la notice du médicament pour plus d'informations.

 **Bimzelx[®]**
(bimekizumab)

CE GUIDE A ÉTÉ CONÇU DANS LE BUT DE VOUS EXPLIQUER COMMENT UTILISER VOTRE SERINGUE BIMZELX®.

BIMZELX® est destiné à être utilisé sous la conduite et la surveillance d'un médecin expérimenté dans le diagnostic et le traitement du psoriasis en plaques.

Après une formation adaptée à la technique d'injection sous-cutanée, vous pourrez vous auto-injecter BIMZELX®, conformément aux instructions d'utilisation fournies dans la notice.

1. Instructions d'utilisation	4
2. Comment injecter BIMZELX® ?	6
3. Comment conserver BIMZELX® ?	14
4. Comment éliminer les déchets ?	16
5. Comment voyager avec votre traitement ?	18
6. Calendrier d'injection	28
7. Coordonnées de vos professionnels de santé	30

SOMMAIRE

1. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INFORMATIONS IMPORTANTES


- » Votre professionnel de santé doit vous montrer comment préparer et injecter BIMZELX® à l'aide de la seringue préremplie.
- » **Ne vous injectez pas BIMZELX®** tant que vous n'avez pas reçu une formation adaptée.
- » Vous et/ou votre soignant devez lire ces instructions d'utilisation avant chaque utilisation de BIMZELX®.
- » Appelez votre professionnel de santé si vous ou votre soignant avez des questions sur la bonne manière d'injecter BIMZELX®.
- » **Pour recevoir votre dose complète, vous devrez utiliser 2 seringues préremplies de BIMZELX®, l'une après l'autre.**
- » Vous trouverez dans cette brochure les instructions détaillées pour réaliser cette injection, et vous pouvez également utiliser le flash-code sur la page 13 pour accéder à la vidéo explicative.
- » En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.
- » Si vous ressentez un quelconque effet indésirable ou en cas d'erreur médicamenteuse, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier.ère. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.



Pour vous aider à organiser vos injections de BIMZELX®, nous mettons à votre disposition un calendrier que vous pourrez retrouver dans la rubrique « Calendrier d'injection » (p. 28-29). Vous pourrez ainsi indiquer la dose, la date et la/les zone(s) d'injection. Suivez attentivement la prescription de votre médecin pour connaître la dose nécessaire.

Lisez toutes les instructions ci-dessous avant d'utiliser la seringue préremplie de BIMZELX®.



Seringue préremplie de BIMZELX®

Informations importantes :

- » La seringue préremplie de BIMZELX® comporte un dispositif de sécurité de l'aiguille. Celui-ci recouvrira l'aiguille automatiquement une fois l'injection terminée. Le dispositif de sécurité de l'aiguille aide à éviter que l'aiguille blesse une personne qui manipule la seringue préremplie après l'injection.

N'utilisez pas ce médicament et rapportez-le à la pharmacie si :

- » La date de péremption (mention «EXP») est dépassée.
- » Le sceau de la boîte est rompu.
- » La seringue préremplie est tombée ou semble endommagée.
- » Le liquide a été congelé (même s'il a été décongelé par la suite).

Pour un plus grand confort lors de l'injection : sortez les seringues préremplies du réfrigérateur et posez-les sur une surface plane à température ambiante pendant **30 à 45** minutes avant l'injection.


- » Ne les réchauffez d'aucune autre manière, comme dans un four à micro-ondes ou dans de l'eau chaude.
- » N'agitez pas les seringues préremplies.
- » Ne retirez pas le capuchon des seringues préremplies avant d'être prêt(e) à réaliser l'injection.

2. COMMENT INJECTER BIMZELX® ?

Suivez les étapes ci-dessous à chaque utilisation de BIMZELX®

➤ ÉTAPE 1 : préparation aux injections

Placez les éléments suivants sur une surface de travail propre, plane et bien éclairée, comme une table :



2 seringues préremplies
de BIMZELX®

Vous aurez également besoin de (non inclus dans la boîte) :



Lingette
imbibée
d'alcool



Lingette
imbibée
d'alcool

2 lingettes imbibées d'alcool



2 boules de coton propres



1 collecteur d'aiguilles


Commencez avec une seringue préremplie pour la première injection.

L'administration de la dose complète nécessite 2 injections, effectuées l'une après l'autre.

➤ ÉTAPE 2 : choisissez le site d'injection et préparez votre injection

Choisissez votre site d'injection.

- » Les endroits que vous pouvez utiliser pour votre injection sont :
 - » Le ventre (abdomen) ou la cuisse.
 - » L'arrière du bras peut également être utilisé si un soignant vous administre l'injection.



- » N'injectez pas dans des zones où la peau est sensible, contusionnée, rouge, squameuse, dure ou dans des zones de cicatrices ou de vergetures.
- » N'injectez pas à moins de 5 cm autour du nombril (ombilic).
- » Vous devrez utiliser un endroit différent pour chaque injection. Ne vous injectez pas deux fois de suite au même endroit.

Lavez-vous bien les mains à l'eau et au savon et séchez-les à l'aide d'une serviette propre.



2. COMMENT INJECTER BIMZELX® ?


Préparez votre peau.

- » Nettoyez le site d'injection avec un tampon alcoolisé. Laissez la zone sécher complètement. Ne touchez plus la zone nettoyée avant de réaliser l'injection.



Vérifiez la seringue préremplie.


- » Assurez-vous que le nom BIMZELX® et la date de péremption (EXP) figurent sur l'étiquette.
- » Vérifiez le médicament à travers la fenêtre de visualisation. Le médicament doit être limpide à légèrement opalescent et exempt de particules. Il peut être incolore à jaune brun-pâle. Vous pourriez voir des bulles d'air dans le liquide. C'est normal.
- » N'utilisez pas la seringue préremplie de BIMZELX® si le médicament est trouble, a changé de couleur ou contient des particules.



➤ ÉTAPE 3 : injectez BIMZELX® avec la SERINGUE préremplie

Retirez le capuchon de la seringue préremplie.

- » Tenez d'une main la seringue préremplie autour de l'ailette de préhension. Retirez le capuchon en tirant la seringue préremplie avec l'autre main. Il se peut qu'une goutte de liquide apparaisse au bout de l'aiguille, cela est normal.
- » **Ne touchez pas** l'aiguille et ne laissez pas l'aiguille entrer en contact avec une surface.
- » **Ne tenez pas** la tige du piston pendant que vous retirez le capuchon. Si vous retirez par erreur la tige du piston, jetez la seringue préremplie dans le collecteur d'aiguilles et prenez-en une nouvelle.
- » **Ne remettez pas** le capuchon sur l'aiguille. Vous pourriez sinon endommager l'aiguille ou vous piquer vous-même par accident.




2. COMMENT INJECTER BIMZELX® ?

Pincez délicatement la peau et maintenez d'une main un pli de peau que vous avez nettoyé pour l'injection. De l'autre main, insérez l'aiguille dans la peau selon un angle d'environ 45 degrés.


- » Enfoncez l'aiguille jusqu'au bout. Relâchez ensuite délicatement votre peau. Veillez à ce que l'aiguille soit en place.



Enfoncez fermement la tête du piston jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout le médicament soit injecté.



Tout le médicament est injecté lorsque vous ne pouvez plus enfoncer davantage la tête du piston.




**Retirez votre pouce de la tête du piston.
L'aiguille se rétracte automatiquement et se verrouille en place.**

- » Appuyez une boule de coton sur le site d'injection pendant quelques secondes. Ne frottez pas le site d'injection. Vous pouvez observer un léger saignement ou une goutte de liquide. Cela est normal. Vous pouvez recouvrir le site d'injection d'un petit pansement adhésif, si nécessaire.

2. COMMENT INJECTER BIMZELX[®] ?

➤ ÉTAPE 4 : jetez la seringue préremplie usagée de BIMZELX[®]

Placez la seringue préremplie usagée dans un collecteur d'aiguilles, immédiatement après utilisation.



Pour la deuxième injection de votre dose prescrite, utilisez une nouvelle seringue préremplie de BIMZELX[®] et répétez les étapes 2 à 4.

Veillez à sélectionner un autre site d'injection pour votre deuxième injection.

Pour accéder à une vidéo des étapes d'injection

Flashez le code ci-dessous ou rendez-vous sur la page BIMZELX® du site : <https://www.ucb-france.fr/Nos-médicaments/Immunologie/bimzelx-bimekizumab/Video-bimzelx-seringue>



BIMZELX® en seringue préremplie

Pour toute question ou complément d'information, n'hésitez pas à contacter votre professionnel de santé ou appelez le numéro vert UCB suivant :

0 805 222 949 Service & appel gratuits *

*Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine.

3. COMMENT CONSERVER BIMZELX® ?

- » Tenir ce médicament **hors de la vue et de la portée des enfants.**



- » **À conserver au réfrigérateur** entre 2 °C et 8 °C.
Ne pas congeler.

[2 °C - 8 °C]



-
- » **N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption** indiquée sur l'étiquette et sur la boîte après la mention « EXP ».


La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.



EXP

-
- » Conservez les seringues préremplies dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière.






25 jours max

- » BIMZELX® peut être conservé **hors du réfrigérateur pendant 25 jours au maximum**. Le médicament doit rester dans l'emballage extérieur, à une température ne dépassant pas 25 °C et à l'abri de la lumière directe.
Ne pas utiliser les seringues préremplies au-delà de cette période. Un espace est aménagé sur la boîte afin que vous puissiez inscrire la date à laquelle le médicament a été sorti du réfrigérateur.



- » **Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.** Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.



- » **N'utilisez pas ce médicament** si la solution a changé de couleur, est trouble ou si vous pouvez y voir des particules.

4. COMMENT ÉLIMINER LES DÉCHETS ?

Dans le cas où vous vous auto-injectez avec BIMZELX®, vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets. L'élimination de votre seringue préremplie doit se faire dans les collecteurs DASRI (Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux).

Jetez le seringue dans le collecteur que vous a remis votre pharmacien.

Seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être jetés à la poubelle.

Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement et la rapporter à un point de collecte. Ces déchets ne doivent en aucun cas être mélangés et jetés avec les ordures ménagères.

Pour connaître les points de collecte les plus proches, renseignez-vous auprès de votre pharmacien/médecin, de votre mairie ou sur le site internet : <http://dastri.fr/nous-collectons>

Utilisation du collecteur d'aiguilles

➤ ÉTAPE 1 :

Récupérez le collecteur d'aiguilles à la pharmacie. Les collecteurs d'aiguilles sont disponibles gratuitement dans les pharmacies sur présentation de votre ordonnance pour BIMZELX®.

➤ ÉTAPE 2 :

Réalisez l'injection.

➤ ÉTAPE 3 :

Après l'injection, jetez immédiatement la seringue dans le collecteur. Ne remettez pas le capuchon, qui peut être jeté à la poubelle.

➤ ÉTAPE 4 :

Lorsque la boîte est pleine, fermez-la définitivement et rapportez-la à un point de collecte. Ces déchets ne doivent en aucun cas être mélangés et jetés avec les ordures ménagères.



Attention : ne remplissez pas le collecteur d'aiguilles au-delà du trait supérieur. Lorsque le collecteur est plein, fermez-le définitivement. Le délai de stockage du collecteur d'aiguilles ne doit pas dépasser 3 mois.

5. COMMENT VOYAGER AVEC VOTRE TRAITEMENT ?

- » Si vous êtes en déplacement ou si vous devez transporter votre médicament, il est préférable d'utiliser un sac isotherme avec packs réfrigérants permettant de le transporter en toute sécurité.
- » Assurez-vous des conditions de conservation de BIMZELX® (entre 2 et 8 degrés).
- » Vous pouvez commander votre sac isotherme avec packs réfrigérants en appelant le numéro vert UCB suivant :

0 805 222 949 Service & appel gratuits *



- » Renseignez-vous sur les vaccinations nécessaires pour votre destination via les sites suivants :
 - » Institut Pasteur : <https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage>
 - » Ministère des Affaires étrangères : <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/>
- » Attention, certains vaccins ne doivent pas être administrés durant le traitement par BIMZELX®. Parlez-en à votre médecin.
- » Préparez tous vos traitements pour le séjour.
- » Prévoyez une trousse à pharmacie (notamment pour effectuer la désinfection).

*Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine.

- » Pour vos voyages en avion, munissez-vous de votre ordonnance et d'un certificat médical (que vous trouverez sur les pages suivantes en français et en anglais) afin de transporter le médicament en cabine et pas en soute**. Vous devez consulter les recommandations nationales en matière de transport des médicaments en avion via le site suivant :
<https://www.douane.gouv.fr>
- » Si vous voyagez à l'étranger, munissez-vous d'un certificat médical de préférence en anglais (à retrouver ci-après) et mentionnant la Dénomination Commune Internationale (DCI) de votre traitement, bimekizumab.
- » Si vous voyagez dans un pays membre de l'Union Européenne/Espace économique européen ou en Suisse, pensez à commander votre carte européenne d'assurance maladie (CEAM). Cette carte facilite la prise en charge de soins médicaux en Europe. Elle atteste des droits de son titulaire à l'assurance maladie française.
- » Si vous partez en vacances à l'étranger dans un pays hors Union européenne/Espace économique européen ou en Suisse, seuls les soins médicaux urgents et imprévus pourront, éventuellement, être pris en charge par votre caisse primaire d'assurance maladie à votre retour en France. Pour plus d'informations rendez-vous sur :
<https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-etranger/vacances-etranger>

** Les traitements ne doivent pas voyager en soute avec les bagages à cause du risque de congélation. Certains avions disposent d'un réfrigérateur ou d'une zone réfrigérée, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la compagnie aérienne.





Certificat médical

Docteur

Téléphone

Adresse

Je soussigné(e), Docteur

Certifie que, Mme/M.

Souffre de psoriasis en plaques nécessitant la prise du traitement suivant administré en injections sous-cutanées :

Nom commercial et DCI

Ce traitement nécessite qu'il/qu'elle puisse garder dans la cabine de l'avion le produit nécessaire aux injections.

Certificat médical établi à

Date

Signature

Cachet du médecin

Medical certificate

Doctor

Phone

Address

I, the undersigned, Doctor

Certify that Mrs/Mr

Is affected by a plaque psoriasis and is treated for this condition with the following medication managed with the use of subcutaneous injections

Brand and INN

This treatment requires that he/she be allowed to carry the drug and the medical materials for the injections in the cabin of the plane.

Medical certificate drawn up to:

Date

Signature

Doctor's stamp





Certificat médical

Docteur

Téléphone

Adresse

Je soussigné(e), Docteur

Certifie que, Mme/M.

Souffre de psoriasis en plaques nécessitant la prise du traitement suivant administré en injections sous-cutanées :

Nom commercial et DCI

Ce traitement nécessite qu'il/qu'elle puisse garder dans la cabine de l'avion le produit nécessaire aux injections.

Certificat médical établi à

Date

Signature

Cachet du médecin

Medical certificate

Doctor

Phone

Address

I, the undersigned, Doctor

Certify that Mrs/Mr

Is affected by a plaque psoriasis and is treated for this condition with the following medication managed with the use of subcutaneous injections

Brand and INN

This treatment requires that he/she be allowed to carry the drug and the medical materials for the injections in the cabin of the plane.

Medical certificate drawn up to:

Date

Signature

Doctor's stamp





Certificat médical

Docteur

Téléphone

Adresse

Je soussigné(e), Docteur

Certifie que, Mme/M.

Souffre de psoriasis en plaques nécessitant la prise du traitement suivant administré en injections sous-cutanées :

Nom commercial et DCI

Ce traitement nécessite qu'il/qu'elle puisse garder dans la cabine de l'avion le produit nécessaire aux injections.

Certificat médical établi à

Date

Signature

Cachet du médecin

Medical certificate

Doctor

Phone

Address

I, the undersigned, Doctor

Certify that Mrs/Mr

Is affected by a plaque psoriasis and is treated for this condition with the following medication managed with the use of subcutaneous injections

Brand and INN

This treatment requires that he/she be allowed to carry the drug and the medical materials for the injections in the cabin of the plane.

Medical certificate drawn up to:

Date

Signature

Doctor's stamp



6. CALENDRIER D'INJECTION

Vous devrez utiliser un endroit différent pour chaque injection.
Ne vous injectez pas deux fois de suite au même endroit.

Période d'initiation

1 dose = 2 injections sous-cutanées de 160 mg chacune, toutes les 4 semaines jusqu'à la **16^e semaine**.



Semaine	Date
0	... / ... / ...
4	... / ... / ...
8	... / ... / ...
12	... / ... / ...
16	... / ... / ...

Dose = 320 mg	
INJ n°1	INJ n°2

Ventre		Cuisse		Arrière bras*	
D	G	D	G	D	G

Période d'entretien

1 dose = 2 injections sous-cutanées de 160 mg chacune, toutes les 8 semaines.

La dose d'entretien, **à partir de la 16^e semaine**, est de 320 mg toutes les 8 semaines. En fonction de votre poids, votre médecin peut décider d'adapter la posologie de la période d'entretien.



Semaine	Date
24	... / ... / ...
32	... / ... / ...
40	... / ... / ...
48	... / ... / ...

Dose = 320 mg	
INJ n°1	INJ n°2

Ventre		Cuisse		Arrière bras*	
D	G	D	G	D	G

* L'arrière du bras peut également être utilisé si un soignant vous administre l'injection.

D : droite ; G : gauche ; INJ : injection.

7. COORDONNÉES DE VOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ



Médecin traitant

Nom Prénom Téléphone E-mail

.....



Dermatologue hospitalier

Nom Prénom Téléphone E-mail

.....



Dermatologue de ville

Nom Prénom Téléphone E-mail

.....



Pharmacien/ne

Nom Prénom Téléphone E-mail

.....

Infirmier.ère

Nom Prénom Téléphone E-mail

.....

Autre(s)

Spécialité.....

Nom Prénom Téléphone E-mail

.....

Spécialité.....

Nom Prénom Téléphone E-mail

.....

Spécialité.....

Nom Prénom Téléphone E-mail

.....

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement
la prescription de votre médecin.

Pour plus d'informations, consultez la notice dans la boîte de votre traitement
ou sur la base de données publique des médicaments :
<https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>



Inspired by **patients.**
Driven by **science.**

*Inspirés par les **patients.** Guidés par la **science.***